

第 16 章 抗帕金森病药

一、A 型题 (1~12)

1. 下列何药通过促进多巴胺能神经末梢释放多巴胺而产生抗帕金森病作用 ()
 - A. levodopa
 - B. amantadine
 - C. carbidopa
 - D. selegiline
 - E. bromocriptine

2. 下列何种抗帕金森病药单用时无效 ()
 - A. 苯海索
 - B. 溴隐亭
 - C. 金刚烷胺
 - D. 左旋多巴
 - E. 卡比多巴

3. 下列何药通过补充纹状体多巴胺不足而产生抗帕金森病作用 ()
 - A. 左旋多巴
 - B. 苯海索
 - C. 卡比多巴
 - D. 溴隐亭
 - E. 金刚烷胺

4. 左旋多巴治疗帕金森病初期常见的不良反应是 ()
 - A. 胃肠道反应
 - B. 开-关现象
 - C. 不自主异常运动
 - D. 幻觉、妄想
 - E. 焦虑、失眠

5. 前列腺肥大者慎用 ()
 - A. pergolide
 - B. amantadine
 - C. carbidopa
 - D. trihexyphenidyl
 - E. bromocriptine

6. 可抑制左旋多巴在外周的脱羧, 使其疗效增强且不良反应减少的药物是 ()
 - A. 培高利特
 - B. 金刚烷胺
 - C. 卡比多巴
 - D. 苯海索
 - E. 溴隐亭

7. 下列何药通过阻断中枢胆碱受体而产生抗帕金森病作用 ()
- 左旋多巴
 - 苯海索
 - 卡比多巴
 - 溴隐亭
 - 金刚烷胺
8. 下列哪一项, 不是左旋多巴的不良反应 ()
- 恶心、呕吐
 - 体位性低血压
 - 不自主异常运动
 - 幻觉、妄想
 - 肌肉震颤
9. 下列何药可用于抗精神病药引起的帕金森综合症 ()
- 苯海索
 - 溴隐亭
 - 金刚烷胺
 - 左旋多巴
 - 卡比多巴
10. 禁与左旋多巴合用的药物是 ()
- 苯海索
 - 苄丝肼
 - 金刚烷胺
 - 维生素 B₆
 - 卡比多巴
11. 下列何药单用有抗帕金森病作用 ()
- 多巴胺
 - 甲基多巴
 - 左旋多巴
 - 卡比多巴
 - 山莨菪碱
12. 下列何药可抑制 MAO_B 使多巴胺代谢降低 ()
- 金刚烷胺
 - 卡比多巴
 - 左旋多巴
 - 溴隐亭
 - 司来吉兰

二、X 型题 (13~15)

13. Levodopa 抗帕金森病作用的特点是 ()
- A. 起效慢, 用药 2~3 周才起效
 - B. 对年轻患者的疗效较老年患者好
 - C. 不能用于治疗抗精神病药引起帕金森综合症
 - D. 对肌肉强直和运动障碍的疗效较震颤好
 - E. 对轻症患者的疗效较重症患者好
14. 苯海索抗帕金森病作用的特点包括 ()
- A. 对左旋多巴无效的患者仍然有效
 - B. 起效慢, 用药 2~3 周才起效
 - C. 可用于抗精神病药引起帕金森综合症
 - D. 对震颤的疗效好, 对肌肉强直和运动障碍疗效较差
 - E. 与左旋多巴合用可使半数患者症状进一步改善
15. 下列哪些药物通过激动多巴胺受体而产生抗帕金森作用 ()
- A. pergolide
 - B. carbidopa
 - C. levodopa
 - D. bromocriptine
 - E. selegiline