

第 32 章 子宫平滑肌兴奋药和抑制药

一、A 型题 (1~7)

缩宫素兴奋子宫作用表现为 ()

- A. 兴奋子宫作用性质与正常分娩时不同
- B. 兴奋作用不因生理状态不同而改变
- C. 小剂量可引起节律性收缩
- D. 孕激素可提高缩宫素的敏感性
- E. 妊娠子宫对缩宫素的敏感性几乎无个体差异

下列哪一项不是缩宫素的作用 ()

- A. 小剂量引起子宫节律性收缩
- B. 大剂量引起子宫强制性收缩
- C. 收缩乳腺泡周围的肌上皮细胞, 促进排乳
- D. 收缩血管平滑肌, 引起血压升高
- E. 抗利尿作用

无产道障碍而宫缩无力的难产应选用 ()

- A. 静脉滴注大剂量缩宫素
- B. 静脉滴注小剂量缩宫素
- C. 肌肉注射麦角新碱
- D. 口服麦角胺
- E. 肌肉注射垂体后叶素

缩宫素的主要不良反应 ()

- A. 过量引起持续性强直收缩
- B. 妊娠高血压
- C. 过敏性休克
- D. 恶心、呕吐
- E. 腹痛、腹泻

麦角碱类兴奋子宫作用表现为 ()

- A. 兴奋子宫平滑肌作用较弱
- B. 大剂量不易引起强直性收缩
- C. 兴奋子宫作用性质与正常分娩时相同
- D. 妊娠子宫较未孕子宫对麦角碱类敏感
- E. 对子宫体的兴奋作用强于对子宫颈的兴奋作用

麦角新碱的临床应用 ()

- A. 催产
- B. 引产
- C. 产后子宫出血
- D. 扩张及软化宫颈
- E. 抗早孕

治疗偏头痛较好的药物组合是（ ）

- A. 麦角新碱+阿司匹林
- B. 麦角毒+咖啡因
- C. 麦角胺+阿司匹林
- D. 麦角胺+咖啡因
- E. 麦角胺+对乙酰氨基酚

二、X型题（8~9）

缩宫素兴奋子宫作用特点是（ ）

- A. 与缩宫素受体结合，发挥兴奋子宫平滑肌作用
- B. 雌激素可降低子宫平滑肌对缩宫素敏感性
- C. 孕激素可提高子宫平滑肌对缩宫素敏感性
- D. 小剂量缩宫素可引起类似分娩时节律性收缩
- E. 大剂量缩宫素可引起妊娠末期子宫强直性收缩

麦角新碱制剂用药注意（ ）

- A. 麦角流浸膏慎用于肝病患者
- B. 麦角新碱慎用于妊娠高血压产妇
- C. 麦角制剂禁用于催产
- D. 麦角制剂禁用于引产
- E. 麦角制剂禁用于冠状动脉硬化患者