

### 第 33 章 性激素类药及避孕药

#### 一、A 型题 (1~15)

有关雌激素作用的叙述，下列哪一项是错误的 ( )

- A. 促使第二性征和性器官发育成熟
- B. 参与形成月经周期
- C. 小剂量可抑制乳汁分泌
- D. 增加骨骼钙盐沉积
- E. 有水、钠潴留作用

下列哪一项不是雌激素类药的临床用途 ( )

- A. 绝经期综合征
- B. 卵巢功能不全和闭经
- C. 功能性子宫出血
- D. 绝经前乳腺癌
- E. 前列腺癌

下列哪一种药物可治疗乳房胀痛 ( )

- A. norethisterone
- B. progesterone
- C. diethylstilbestrol
- D. testosterone phenylacetate
- E. nandrolon phenylpropionate

雌激素禁用于 ( )

- A. 有出血倾向的子宫肿瘤
- B. 晚期乳腺癌
- C. 前列腺癌
- D. 功能性子宫出血
- E. 青春期痤疮

下列哪一项是正确描述地氯米芬的特点 ( )

- A. 对生殖系统发挥拟雌激素样作用
- B. 对心血管系统发挥抗雌激素样作用
- C. 抑制卵巢雌激素合成，发挥抗雌激素作用
- D. 阻断下丘脑雌激素受体，减少垂体前叶分泌促性腺激素
- E. 主要用于卵巢囊肿的治疗

有关孕激素作用的叙述，下列哪一项是错误的 ( )

- A. 可降低子宫平滑肌对缩宫素的敏感性
- B. 与雌激素一起使乳腺腺泡发育
- C. 抑制 LH 分泌
- D. 有抗利尿作用
- E. 有轻度升温作用

黄体功能不足所致先兆流产可选用 ( )

- A. 炔雌醇
- B. 炔诺酮
- C. 己烯雌酚
- D. 苯丙酸诺龙
- E. 甲基睾丸素

下列哪一项不是孕激素类药的临床用途 ( )

- A. 功能性子宫出血
- B. 习惯性流产
- C. 先兆性流产
- D. 前列腺癌
- E. 青春期痤疮

治疗前列腺癌宜选用 ( )

- A. 氯米芬
- B. 炔雌醇
- C. 苯丙酸诺龙
- D. 丙酸睾酮
- E. 苯乙酸睾酮

下列哪种疾病宜选用雄激素治疗 ( )

- A. 绝经期综合征
- B. 乳房胀痛
- C. 前列腺癌
- D. 青春期痤疮
- E. 再生障碍性贫血

下列哪一种药物是促进蛋白质合成的 ( )

- A. dithylstilbestrol
- B. ethinylestradiol
- C. nandrolon phenypropionate
- D. progesterone
- E. clomiphene

下列哪一种药物可治疗糖皮质激素引起的负氮平衡 ( )

- A. 黄体酮
- B. 苯丙酸诺龙
- C. 炔诺酮
- D. 炔雌醇
- E. 甲基睾丸素

主要抑制排卵的避孕药是 ( )

- A. 雌激素+孕激素

- B. 甲基睾丸素
- C. 大剂量炔诺酮
- D. 己烯雌酚
- E. 前列腺素

长效口服避孕药是 ( )

- A. 复方炔诺酮片
- B. 甲地孕酮片
- C. 复方炔诺孕酮甲片
- D. 复方氯地孕酮片
- E. 双炔失碳酯片

抗着床的避孕药是 ( )

- A. 复方氯地孕酮
- B. 复方炔诺酮
- C. 大剂量炔雌醇
- D. 大剂量炔雌醚
- E. 大剂量炔诺酮

## 二、X型题 (16~20)

短效口服避孕药作用机制是 ( )

- A. 抑制下丘脑-垂体-卵巢轴, 使排卵过程受抑
- B. 抑制子宫内膜的正常发育, 使受精卵着床过程受抑
- C. 抑制下丘脑-垂体-卵巢轴, 使受精过程受抑
- D. 改变宫颈粘液, 影响精子进入宫腔
- E. 影响输卵管正常活动, 改变受精卵运行速度, 以致受精卵不能适时到达子宫

短效避孕药的不良反应包括 ( )

- A. 类早孕反应
- B. 子宫不规则出血
- C. 乳汁减少
- D. 体位性低血压
- E. 凝血功能亢进

同化激素类药物长期使用时注意事项 ( )

- A. 水钠潴留
- B. 女性患者男性化现象
- C. 胆汁淤积性黄疸
- D. 肾炎、心力衰竭和肝功能不良患者慎用
- E. 孕妇及前列腺癌患者禁用

有水钠潴留作用的药物是 ( )

- A. 雌激素
- B. 孕激素

- C. 氯米芬
- D. 雄激素
- E. 同化激素