

第 41 章 四环素类及氯霉素类抗生素

一、A 型题 (1~10)

用于伤寒的药物是 ()

- A. 头孢噻吩、羧苄西林
- B. 氯霉素、氨苄西林
- C. 四环素、红霉素
- D. 链霉素、青霉素 G
- E. 氯霉素、青霉素 G

多西环素 ()

- A. 作用维持时间比四环素短
- B. 抗菌作用比四环素弱
- C. 口服吸收差
- D. 肾功能不全时可使用
- E. 对绿脓杆菌有效

下列哪项不是四环素类药物的不良反应 ()

- A. 胃肠道反应
- B. 二重感染
- C. 影响骨、牙生长
- D. 灰婴综合征
- E. 肾毒性

氯霉素临床使用受限是因为该药 ()

- A. 影响骨、牙生长
- B. 严重损害肝脏
- C. 抑制骨髓
- D. 胃肠道反应
- E. 使牙釉质发育不全

会引起可逆性前庭反应的药物是 ()

- A. 四环素
- B. 土霉素
- C. 多西环素
- D. 米诺环素
- E. 金霉素

用于治疗立克次体感染的抗菌药物是 ()

- A. 青霉素 G、四环素
- B. 四环素、氯霉素
- C. 链霉素、氯霉素
- D. 庆大霉素、四环素
- E. 氯霉素、红霉素

治疗支原体肺炎应选用 ()

- A. 青霉素 G
- B. 庆大霉素
- C. 四环素
- D. 头孢他定
- E. 氯霉素

使用时需要定期查血象的抗菌药物是 ()

- A. 四环素
- B. 氯霉素
- C. 红霉素
- D. 庆大霉素
- E. 青霉素 G

易通过血脑屏障的四环素类药物是 ()

- A. 金霉素
- B. 四环素
- C. 土霉素
- D. 多西环素
- E. 米诺环素

氯霉素抗菌的作用部位是 ()

- A. DNA 回旋酶
- B. RNA 多聚酶
- C. tRNA
- D. 70s 核蛋白体
- E. 核蛋白体 50s 亚基

二、X 型题 (11~13)

关于四环素正确的描述是 ()

- A. 多价阳离子影响四环素的吸收
- B. 能在新形成的牙中沉积
- C. 对多种细菌有效
- D. 对立克次体、支原体、病毒都有作用
- E. 对骨髓有明显的抑制作用

关于氯霉素正确的描述是 ()

- A. 抑制肽酰基转移酶
- B. 易通过血脑屏障
- C. 抗菌谱广，临床广泛使用
- D. 用于治疗眼部感染
- E. 与骨中的钙结合，抑制骨髓

氯霉素引起“灰婴综合征” ()

- A. 可导致死亡
- B. 与肝脏功能有关
- C. 与肾脏功能有关
- D. 是循环衰竭的表现
- E. 仅发生在新生儿及早产儿