

## 第45章 抗疟药

### 一、A型题 (1~7)

主要用于控制症状的抗疟药为 ( )

- A. 氯喹
- B. 伯氨喹
- C. 乙胺嘧啶
- D. 周效磺胺
- E. 氨苯砒

主要用于控制复发和传播的抗疟药为 ( )

- A. 氯喹
- B. 伯氨喹
- C. 乙胺嘧啶
- D. 青蒿素
- E. 奎宁

主要用于病因性预防的抗疟药为 ( )

- A. 氯喹
- B. 伯氨喹
- C. 乙胺嘧啶
- D. 青蒿素
- E. 奎宁

下列哪一项,不是奎宁的不良反应 ( )

- A. 金鸡纳反应
- B. 致死性心律失常
- C. 特异质反应
- D. 子宫兴奋作用
- E. 高铁血红蛋白血症

根治间日疟最有效的药物是 ( )

- A. 氯喹
- B. 青蒿素
- C. 伯氨喹
- D. 奎宁
- E. 乙胺嘧啶

乙胺嘧啶抗疟原虫的机制为 ( )

- A. 抑制二氢叶酸合成酶
- B. 抑制二氢叶酸还原酶
- C. 抑制蛋白酶
- D. 抑制血红素聚合酶
- E. 影响 DNA 复制和 RNA 转录

对耐氯喹的恶性疟有效，但复发率高的药物为（ ）

- A. 伯氨喹
- B. 乙胺嘧啶
- C. 奎宁
- D. 青蒿素
- E. 甲氟喹

## 二、X 型题 (8~10)

氯喹的抗疟机制为（ ）

- A. 抑制疟原虫蛋白酶活性
- B. 抑制疟原虫血红素聚合酶活性
- C. 抑制二氢叶酸还原酶活性
- D. 损伤疟原虫线粒体
- E. 插入疟原虫 DNA 双螺旋结构中，形成复合物

下列哪几项，不是氯喹的作用（ ）

- A. 抗疟作用
- B. 抗肿瘤作用
- C. 抗血吸虫作用
- D. 抗肠道外阿米巴病作用
- E. 免疫抑制作用

治疗对氯喹耐药的恶性疟，可选用（ ）

- A. 奎宁
- B. 甲氟喹
- C. 哌喹
- D. 青蒿素
- E. 伯氨喹