

第46章 抗阿米巴病药及抗滴虫病药

一、A型题(1~8)

治疗急性阿米巴痢疾和肠外阿米巴病首选()

- A. 甲硝唑
- B. 二氯尼特
- C. 喹碘方
- D. 依米丁
- E. 氯喹

目前治疗贾第鞭毛虫病最有效的药物是()

- A. 喹碘方
- B. 替硝唑
- C. 甲硝唑
- D. 二氯尼特
- E. 氯喹

目前最有效的杀包囊药是()

- A. 甲硝唑
- B. 二氯尼特
- C. 喹碘方
- D. 依米丁
- E. 氯喹

治疗阴道滴虫病最有效的药物是()

- A. 甲硝唑
- B. 二氯尼特
- C. 喹碘方
- D. 氯喹
- E. 乙酰肿胺

对肠内、外阿米巴病都有效的药物为()

- A. 依米丁
- B. 二氯尼特
- C. 氯喹
- D. 甲硝唑
- E. 喹碘方

下列哪一项,不是依米丁的不良反应()

- A. 心脏毒性
- B. 神经肌肉阻断作用
- C. 局部刺激
- D. 胃肠道反应
- E. 共济失调

现有的抗阿米巴病药物主要用于()

- A. 裂殖体
- B. 滋养体

- C. 配子体
- D. 螺旋体
- E. 包囊

无症状的阿米巴排包囊者宜选用 ()

- A. 甲硝唑
- B. 依米丁
- C. 喹碘方
- D. 二氯尼特
- E. 氯喹

二、X 型题 (9~12)

甲硝唑可用于治疗 ()

- A. 急性阿米巴痢疾
- B. 贾第鞭毛虫病
- C. 腹腔内厌氧菌感染
- D. 阴道滴虫病
- E. 肠外阿米巴病

关于甲硝唑, 叙述正确的是 ()

- A. 对阿米巴大滋养体有直接杀灭作用
- B. 对肠腔内阿米巴小滋养体和包囊作用明显
- C. 长期用于治疗厌氧菌感染易诱发二重感染
- D. 最常见的不良反应为神经系统症状
- E. 服药期间应禁酒

可用于治疗阴道滴虫病的药物有 ()

- A. 二氯尼特
- B. 喹碘方
- C. 氯喹
- D. 乙酰胂胺
- E. 甲硝唑

关于抗阿米巴药, 叙述正确的是 ()

- A. 甲硝唑对急性阿米巴痢疾和肠外阿米巴病有良好疗效
- B. 二氯尼特是目前最有效的杀包囊药
- C. 喹碘方可用于治疗阿米巴排包囊者, 或与甲硝唑合用于急性阿米巴痢疾
- D. 依米丁对心脏有严重毒性
- E. 氯喹对肠内阿米巴病有效