

## 第 6 章 胆碱受体激动药

---

### 一、单项选择题(A型题)(44~46)

44. 毛果芸香碱(匹鲁卡品, Pilocarpine)滴眼引起( )

- A. 缩瞳、眼内压升高, 调节痉挛
- B. 缩瞳、眼内压降低, 调节痉挛
- C. 缩瞳、眼内压降低, 调节麻痹
- D. 扩瞳、眼内压升高, 调节麻痹
- E. 扩瞳、眼内压升高, 调节痉挛

45. 对卡巴胆碱(氨甲酰胆碱)描述错误的是( )

- A. 激动 M 和 N 受体
- B. 可促进胆碱能神经末梢释放乙酰胆碱
- C. 对此药引起的中毒阿托品的解毒效果好
- D. 全身用药时不良反应多
- E. 局部滴眼可治疗青光眼

46. 烟碱(Nicotine)( )

- A. 激动  $N_2$  受体, 可治疗重症肌无力
- B. 激动 M 受体

- C. 阻断  $N_1$  受体,可治疗高血压
- D. 小剂量激动 N 受体,大剂量阻断 N 受体
- E. 小剂量阻断 N 受体,大剂量激动 N 受体

二、多项选择题(X 型题)(47 ~ 49)

47. M 胆碱受体激动时( ) ( ) ( ) ( ) ( )

- A. 心率减慢
- B. 腺体分泌增加
- C. 瞳孔括约肌和睫状肌松弛
- D. 支气管和胃肠道平滑肌收缩
- E. 肾上腺髓质释放肾上腺素

48.  $N$  胆碱受体激动时( ) ( ) ( ) ( ) ( )

- A. 血管舒张
- B. 腺体分泌增加
- C. 胃肠道和泌尿道平滑肌收缩
- D. 肾上腺髓质释放肾上腺素
- E. 骨骼肌收缩

49. 毛果芸香碱( ) ( ) ( ) ( ) ( )

- A. 选择性激动 M 胆碱受体
- B. 对眼和胃肠道平滑肌兴奋作用强
- C. 对眼的作用较毒扁豆碱温和而短暂
- D. 适用于闭角型和开角型青光眼的治疗
- E. 可松弛瞳孔开大肌,引起缩瞳